

FOLFOX+ニボルマブ療法

		休業終了日
		Day14
		Day1
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコ-ワ錠10mg … 5錠 1日1回 オキサリプラチン開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカドロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>静脈内注射 … 1 大塚生食注(20ml) … 1管 CVポート又はPICC留置時の投与前フラッシュ用 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 オプジーボ注【規格分解用】 … 240mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 希釈後の濃度が1.9mg/mL以上となるよう調製 30分間かけて 本管① 1回</p> <p>-----</p> <p>アロキン点滴静注パック0.75mg (50mL) … 1袋 デカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 フモチン注射液20mg「ト-ワ」2mL(先発:ガスター) … 1管 15分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 側管 本管③と同時に 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 オキサリプラチン注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 本管③ レボホリナートと同時に 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑤ 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬 … 1mL フルオウラシル注(バクスター-230mL用)【規格分解 … 1mg 46時間かけて バクスターインフュージョンポンプLV5に充填 本管⑥ 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生食注シリンジ「オ-ツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒 インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。 管注 … 1 1回</p>	