

Weeklyアルブミン懸濁型パクリタクセル療法

				休薬終了日
	Day1	Day8	Day15	Day28
投薬				
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アフラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アフラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アフラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 1回</p>	