

	Day1	Day2	Day3
投薬		<p>■---【投薬】</p> <p>フルメトン点眼液0.1% (5ml) … 1本 1日4回 両眼に 1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発: カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ソル・マトロール静注用40mg(mg用) … 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 メトレキセト注[MTX](液体)【規格分 … 1 mg 1時間かけて 10時 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 メトレキセト注[MTX](液体)【規格分 … 1 mg 23時間かけて 11時 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ソル・マトロール静注用40mg(mg用) … 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発: カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ソル・マトロール静注用40mg(mg用) … 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 シタラビン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>ロイコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 22時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ソル・マトロール静注用40mg(mg用) … 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 シタラビン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 シタラビン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ロイコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 4時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>ロイコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 10時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発: カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ソル・マトロール静注用40mg(mg用) … 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 シタラビン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>ロイコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 16時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>ロイコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 22時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 ソル・マトロール静注用40mg(mg用) … 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 シタラビン点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 12時間ごと 点滴 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>

	休薬終了日
Day4	Day28
<p>■---【注射】</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 4時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 10時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 16時 静脈内注射 … 1 1回</p>	