

mLSG療法(VECP)

				休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾロン錠【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 3日</p>			
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フィルテシ注[VDS]【規格分解用】… 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 カルボプラチン注[CBDC]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	