

				休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day4
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>イメドカブセル125mg(1日目) … 1カプセル 1日1回 混注OK確認後に内服 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>イメドカブセル80mg(2日目以降) … 1カプセル 1日1回 朝食後 2日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管) 15分間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注【CPA/CPM】【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて エンドキサンと同時に投与 ★開始時刻を薬局へ連絡★ 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて エンドキサンと同時に投与 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注【CPA/CPM】【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始4時間後 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始8時間後 中心静脈注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管) 15分間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注【CPA/CPM】【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて エンドキサンと同時に投与 ★開始時刻を薬局へ連絡★ 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 中心静脈注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管) 15分間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 中心静脈注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管) 15分間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 中心静脈注射 … 1 1回</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 アルケラン静注用【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回</p>