

Mel-200療法(多発性骨髄腫)

		休薬終了日
		Day2
		Day1
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>イメントカプセル125mg(1日目) … 1カプセ 1日1回 混注OK確認後に内服 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>イメントカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセ 1日1回 朝食後 2日</p>
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1 管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 アルケラン静注用【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1 管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 アルケラン静注用【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>