

						休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
投薬				■---【投薬】 インドカプセル125mg(1日目) … 1カプセル 1日1回 エンドキサン投与1時間前に内服 1日	■---【投薬】 インドカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセル 1日1回 朝食後 2日	
注射				■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管) 15分間かけて 中心静脈注射 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 中心静脈注射 … 1 1回 ----- テルモ生食(500ml) … 1袋 エントキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回 ----- テルモ生食(500ml) … 1袋 エントキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 中心静脈注射 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始4時間後 中心静脈注射 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始8時間後 中心静脈注射 … 1 1回	■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管) 15分間かけて 中心静脈注射 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 中心静脈注射 … 1 1回 ----- テルモ生食(500ml) … 1袋 エントキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回 ----- テルモ生食(500ml) … 1袋 エントキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 3時間かけて 中心静脈注射 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 中心静脈注射 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始4時間後 中心静脈注射 … 1 1回 ----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始8時間後 中心静脈注射 … 1 1回	