

	Day1	Day2	Day8	Day9
投薬	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 サークリサ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>			
注射	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(サークリサ)【規 … 250mL サークリサ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 2瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>

Day15	Day16	休薬終了日 Day28
<p>■---【投薬】</p> <p>カロナル錠【500mg】… 2錠 レスタミンコ-7錠10mg … 5錠 1日1回 サークリサ投与30分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>レナテックス錠4mg … 5錠 1日1回 朝食後 6日後から2日間内服 2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 2瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして 2mg) … 2管 15分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 15分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液(サークリサ)【規 … 250mL サークリサ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用 いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1m g 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶 解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 2瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして 2mg) … 2管 15分間かけて 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1m g 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶 解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	