

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカトン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>-----</p> <p>塩酸ミノサイクリンカプセル100mg（先発:ミ … 2C 1日2回 朝・夕 食後 14日</p> <p>-----</p> <p>ヒルトイローション0.3%(50g) … 2本 1日頻回 保湿 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg（50mL） … 1袋 デカトン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 デカトン注射液2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて ベクティビックス投与前 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベクティビックス点滴静注【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて インラインフィルター使用 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ ベクティビックス投与終了後 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 カンプト注[CPT-11]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 点滴 … 1 1回</p>	