

5-FULV ベバシズマブ療法

		休薬終了日
	Day1	Day14
投薬		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>静脈内注射 … 1            大塚生食注(20ml) … 1管            逆血確認用            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶            15分間かけて            本管①            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶            アバステン注【規格分解用】 … 1mg            初回投与は90分、問題がなければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能            本管②            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            5分間かけて            アバステン投与後のフラッシュ用            本管③            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋            レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg            120分間かけて            本管④            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            フルオロラシル注【規格分解用】 … 1mg            全開で            本管⑤            点滴 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL            フルオロラシル注(バクスター230mL用)【規格分解 … 1mg            46 時間かけて            バクスターインフュージョンポンプLV5に充填            本管⑥            抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1            1回</p> <p>-----</p> <p>ヘパリンNa【ロック】100U/mLシリンジ10mL … 1筒            インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。            管注 … 1            1回</p>	