

R-DA-EPOCH療法(レベル1)						休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>プレドニゾン錠【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 ☆☆別パック☆☆ 5日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>					
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発: カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤 … 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】… 1mg オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 24時間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発: カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】… 1mg オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 24時間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発: カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】… 1mg オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 24時間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発: カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1 テルモ生食(500ml) … 1袋 アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】… 1mg オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 24時間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発: カイトリル) … 1管 15分間かけて 側管 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エドキシサン注[CPA/CPM]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 側管 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了 後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	