

				休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day21
投薬				
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ゲラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 テカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ゲラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 テカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 ゲラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 テカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 イホマイド注【IFM】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 イホマイド注【IFM】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 イホマイド注【IFM】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始時 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始時 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始時 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>テルモ生食 250mL … 1袋 カルボプラチン注【CBDCA】【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始4時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始4時間後 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始4時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始8時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始8時間後 点滴 … 1 1回</p>	
	<p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始8時間後 点滴 … 1 1回</p>			