

## BR併用療法(外来用)

			休薬終了日
	Day1	Day2	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠            レスタミンコーワ錠10mg… 5錠            1日1回            リツキシマブ投与30分前に内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】テカロン錠… 2錠            1日1回 朝食後            翌々日から内服            2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1            1日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            グラニセトン静注液1mg「テバ」1mL (先            発:カイトリル)… 1管            テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし            て8mg)… 1瓶            テカロン注射液1.65mg(リン酸エステルと            して2mg)… 2管            15分間かけて            点滴… 1            1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】…            249.6mL            大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml            トリアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1            mg            1時間かけて            トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶            解            点滴… 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶            トリアキシンの側管から            1時間かけて            点滴… 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶            閉鎖式ルートプライミング用と点滴終            了後のフラッシュ用            点滴… 1            1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】…            0.9mL            リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg            朝            点滴… 1            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            グラニセトン静注液1mg「テバ」1mL (先            発:カイトリル)… 1管            テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし            て8mg)… 1瓶            15分間かけて            点滴… 1            1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】…            249.6mL            大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml            トリアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1            mg            1時間かけて            トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶            解            点滴… 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶            トリアキシンの側管から            1時間かけて            点滴… 1            1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶            閉鎖式ルートプライミング用と点滴終            了後のフラッシュ用            点滴… 1            1回</p>	