

トレアキシン標準療法(外来用)

			休薬終了日
	Day1	Day2	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカトロン錠… 2錠 1日1回 朝食後 翌々日から内服 2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセトン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カイトリル)… 1管 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶 デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg)… 2管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トレアキシン)【規格薬剤】… 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml トレアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1mg 1時間かけて トレアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶解 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 トレアキシンの側管から 1時間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】… 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg 朝 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセトン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カイトリル)… 1管 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トレアキシン)【規格薬剤】… 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml トレアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1mg 1時間かけて トレアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶解 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 トレアキシンの側管から 1時間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>	