

BG併用療法<1クール目>

	Day1	Day2	Day3
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠                      レスタミンコーワ錠10mg… 5錠                      1日1回                      ガザイバ投与30～60分前に内服                      1日</p>		<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デキサメタゾン錠… 2錠                      1日1回 朝食後                      2日</p>
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル)… 1管                      デキサメタゾン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶                      デキサメタゾン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg)… 2管                      15分間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】… 249.6mL                      大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml                      トリアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1mg                      1時間かけて                      トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶解                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶                      トリアキシンの側管から                      1時間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶                      閉鎖式ルートプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL (mL用)… 210ml                      ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解… 1000mg                      朝                      点滴… 1                      0.2μmのインラインフィルターを通して投与                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル)… 1管                      デキサメタゾン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶                      15分間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】… 249.6mL                      大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml                      トリアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1mg                      1時間かけて                      トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶解                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶                      トリアキシンの側管から                      1時間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      閉鎖式ルートプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴… 1                      1回</p>	

BG併用療法<

			休薬終了日
	Day8	Day15	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠                      レスタミンコーワ錠10mg … 5錠                      1日1回                      ガザイバ投与30～60分前に内服                      1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠                      レスタミンコーワ錠10mg … 5錠                      1日1回                      ガザイバ投与30～60分前に内服                      1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ソル・コーテフ注射用(100mg) … 1瓶                      60分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL (mL用) … 210ml                      ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解 … 1000mg                      朝                      点滴 … 1                      0.2μmのインラインフィルターを通して投与                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ソル・コーテフ注射用(100mg) … 1瓶                      60分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL (mL用) … 210ml                      ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解 … 1000mg                      朝                      点滴 … 1                      0.2μmのインラインフィルターを通して投与                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p>	