

BG併用療法<2クール目以降>(外来)

			休薬終了日
	Day1	Day2	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 ガザイバ投与30～60分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】テカドロン錠… 2錠 1日1回 朝食後 翌々日から内服開始 2日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カイトリル)… 1管 テカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶 テカドロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg)… 2管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】… 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml トリアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1mg 1時間かけて トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶解 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 トリアキシンの側管から 1時間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 閉鎖式ルートプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL (mL用)… 210ml ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解… 1000mg 朝 点滴… 1 0.2μmのインラインフィルターを通して投与 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カイトリル)… 1管 テカドロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】… 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml トリアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1mg 1時間かけて トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶解 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 トリアキシンの側管から 1時間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 閉鎖式ルートプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>	