

G-CHOP療法<2クール目以降>

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠                      レスタミンコーワ錠10mg … 5錠                      1日1回                      ガザイバ投与30～60分前に内服                      1日</p> <p>-----</p> <p>プレドニゾン錠「タダ」5mg … 20錠                      1日3回 毎食後 … 1                      朝食後 10                      昼食後 6                      夕食後 4                      5日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ソル・コーテフ注射用(100mg) … 1瓶                      60分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL (mL用) … 210ml                      ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解】 … 1000mg                      朝                      点滴 … 1                      0.2μmのインラインフィルターを通して投与                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      グラネセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カイトリル) … 1管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>ソルデム3 輸液(500ml) … 1袋                      エドキシサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg                      90分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      アドリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】 … 1mg                      30分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      オンコピン注[VCR]【規格分解用】 … 1mg                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p>	