

R-GCD療法(外来用)

			休薬終了日
	Day1	Day8	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカドロン錠… 10錠 ☆☆別パック☆☆ 医師の指示通り ケモ室で内服 1日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカドロン錠… 10錠 1日1回 朝食後 ☆☆別パック☆☆ 翌日から内服 3日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカドロン錠… 10錠 ☆☆別パック☆☆ 1日1回 朝食後 本日は昼食後に内服 4日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】… 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg 朝 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセトロン静注1mg「NIG」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml)… 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL… 1袋 カルボプラチン注[CBDCA]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 15分間かけて 点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセトロン静注1mg「NIG」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml)… 1瓶 ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 15分間かけて 点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>	