

	Day1	Day2	休薬終了日
	Day1	Day2	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p> <hr/> <p>【4mg】テカトロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌々日から内服 2日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル) … 1管 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 テカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】 … 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 60ml トリアキシン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 トリアキシンの側管から 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】 … 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】 … 1mg 朝 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ポライビー注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ポライビー30mgに対し蒸留水1.8mLで溶解 0.2μmのインラインフィルターを通して投与 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先発:カイトリル) … 1管 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】 … 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 60ml トリアキシン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 1時間かけて トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで溶解 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 トリアキシンの側管から 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	