

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠                      レスタミンコーワ錠10mg … 5錠                      1日1回                      リツキシマブ投与30分前に内服                      ☆☆別パック☆☆                      1日</p> <hr/> <p>プレドニゾン錠「タタ」5mg … 20錠                      1日3回 毎食後 … 1                      朝食後 10                      昼食後 6                      夕食後 4                      ☆☆別パック☆☆                      5日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1                      1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      ソル・ユー・テフ注射用(100mg) … 1瓶                      グラセロン静注液1mg「NIG」1mL ( … 1管                      15分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】… 0.9mL                      リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg                      朝                      点滴 … 1                      1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1                      大塚生食注(100ml) … 1瓶                      経過観察用                      60分間かけて                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml                      ホライビ-注【規格分解用】… 1mg                      90分間かけて                      点滴 … 1                      ホライビ-30mgに対し蒸留水1.8mLで溶解                      0.2μmのインラインフィルターを通して投与                      1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1                      大塚生食注(100ml) … 1瓶                      経過観察用                      60分間かけて                      1回</p> <hr/> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋                      エトキシサン注[CPA/CPM]【規格分解用】… 1mg                      90分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶                      アトリアン注[ADM/DXR]【規格分解用】… 1mg                      30分間かけて                      点滴 … 1                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶                      閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用                      点滴 … 1                      1回</p>	