

エプコリタマブ療法<1クール目>

	Day1	Day2	Day3	Day4
投薬	<p>■---【投薬】                      レスタミンコーワ錠10mg … 5錠                      カロナール錠【500mg】… 2錠                      1日1回                      エプキンリ投与の30分前                      ☆☆別パック☆☆                      1日</p>			
注射	<p>■---【注射】                      点滴 … 1                      大塚生食注(100ml) … 1瓶                      水溶性プレドニン50mg … 2管                      15分間かけて                      エプキンリ投与30分前までに終了                      1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1                      エプキンリ皮下注初回【規格分解用】… 1mg                      大塚生食注(20ml) … 1管                      ①ハialから0.8mLを抜き生食4.2mLで溶解                      ②調製ハialから2mLを抜き生食8mLで溶解</p>	<p>■---【注射】                      点滴 … 1                      大塚生食注(100ml) … 1瓶                      水溶性プレドニン50mg … 2管                      15分間かけて                      1回</p>	<p>■---【注射】                      点滴 … 1                      大塚生食注(100ml) … 1瓶                      水溶性プレドニン50mg … 2管                      15分間かけて                      1回</p>	<p>■---【注射】                      点滴 … 1                      大塚生食注(100ml) … 1瓶                      水溶性プレドニン50mg … 2管                      15分間かけて                      1回</p>

Day8	Day9	Day10	Day11
<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコ-7錠10mg … 5錠            カロナール錠【500mg】… 2錠            1日1回            エプキンリ投与の30分前            ☆☆別パック☆☆            1日</p>			
<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            エプキンリ投与30分前までに終了            1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1            エプキンリ皮下注2回目【規格分解用】… 1            mg            大塚生食注20ml(ml用) … 4.2ml            バイアルから0.8mLを抜き生食4.2mLで溶解            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>

Day15	Day16	Day17	Day18
<p>■---【投薬】            レスタミンコーワ錠10mg … 5錠            カロナール錠【500mg】… 2錠            1日1回            エプキンリ投与の30分前            ☆☆別パック☆☆            1日</p>			
<p>■---【注射】            点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            エプキンリ投与30分前までに終了            1回</p> <hr/> <p>皮下注 … 1            エプキンリ皮下注【規格分解用】… 1mg            1回</p>	<p>■---【注射】            点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】            点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】            点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>

				休薬終了日
Day22	Day23	Day24	Day25	Day28
<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミン<sup>®</sup>錠10mg … 5錠            カロナール錠【500mg】… 2錠            1日1回            エプキンリ投与の30分前            ☆☆別パック☆☆            1日</p>				
<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            エプキンリ投与30分前までに終了            1回</p> <p>-----</p> <p>皮下注 … 1            エプキンリ皮下注【規格分解用】… 1mg            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1            大塚生食注(100ml) … 1瓶            水溶性プレドニン50mg … 2管            15分間かけて            1回</p>	