

アルブミン懸濁型パクリタキセル+ラムシルマブ療法

	Day1	Day8	Day15	休薬終了日 Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 サイラムザ点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 蛋白質透過型のフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、他の薬剤と同じラインを使用しないこと 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 サイラムザ点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 蛋白質透過型のフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、他の薬剤と同じラインを使用しないこと 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アラキサン点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	