

		休業終了日
	Day1	Day14
投薬	■――【投薬】 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」(1日目)(先発:イメント) … 1C 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日 ----- 【4mg】デカトン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 3日 ----- アプレピタントカプセル80mg「サワイ」(2日目以降)(先発:イメント) … 1C 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日 ----- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	
注射	■――【注射】 大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 静脈内注射 … 1 1回 ----- ハロ/セトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(先発:アロキン) … 1袋 デカトン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカトン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 ファモチシン注射液20mg「トーワ」2mL(先発:ガスター) … 1管 15 分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回 ----- 生理食塩液(ビロイ)【規格薬剤】 … 1mL 大塚蒸留水(20ml) … 2管 ビロイ点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 本管② ビロイ 1/2本目 点滴 … 1 1回 ----- 生理食塩液(ビロイ)【規格薬剤】 … 1mL 大塚蒸留水(20ml) … 2管 ビロイ点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 本管③ ビロイ 2/2本目 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5 分間かけて 本管④ ビロイ投与後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回 ----- テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120 分間かけて 側管 本管⑤と同時に 点滴 … 1 1回 ----- テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 オキサリプラチン注【規格分解用】 … 1mg 120 分間かけて 本管⑤ レボホリナートと同時に 点滴 … 1 1回 ----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオロウラル注【規格分解用】 … 1mg 全開で 本管⑥ 点滴 … 1 1回 ----- 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑦ 1回 ----- 生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL フルオロウラル注(バクスター230mL用)【規格分解 … 1mg 46 時間かけて バクスターインフュージョンポンプLV5に充填 本管⑧ 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回 ----- 生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒 インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。 管注 … 1 1回	