

Ara-C+ACR療法

	Day1	Day2	Day3	Day4
投薬				
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL ( … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アクリソニン注[ACR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL ( … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アクリソニン注[ACR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL ( … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アクリソニン注[ACR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL ( … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アクリソニン注[ACR]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 10時から 22時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋 キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg 22時から 10時まで (精密持続)点滴注射 … 1 1回</p>

	休業終了日
Day5	Day6
<p>■---【注射】  大塚生食注(50ml) … 1瓶  グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL ( … 1  管  15分間かけて  点滴 … 1  1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶  アクリソニン注[ACR]【規格分解用】 … 1mg  30分間かけて  点滴 … 1  1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋  キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg  10時から  22時まで  (精密持続)点滴注射 … 1  1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶  点滴終了後のフラッシュ用  点滴 … 1  1回</p> <p>-----</p> <p>ソルテム3 輸液(500ml) … 1袋  キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】 … 1mg  22時から  10時まで  (精密持続)点滴注射 … 1  1回</p>	<p>■---【注射】  大塚生食注(50ml) … 1瓶  グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL ( … 1  管  15分間かけて  点滴 … 1  1回</p>