

mLSG療法 (VCAP)

		休業終了日
	Day1	Day7
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾロン錠【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ソルデム3 輸液(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/GPM]【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのパライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>メトトレキセート注[MTX](粉末)【規格分 … 1mg キロサイト注[Ara-C]【規格分解用】… 1mg プレドニン水溶性10mg(mg用) … 10mg 大塚生食注20ml(ml用) … 3ml 脳脊髄腔注射3.腰椎 … 1 1回</p>	