

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	休業終了日
投薬	<p>■---【投薬】 テハケン錠200mg…3錠 1日3回 朝・昼・夕食 後 8日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ ☆☆…1 1日</p>						<p>■---【投薬】 イメトカプセル125mg(1日目)…1カプセ 1日1回 エンドキサン投与1時間前に内服 1日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆…1 1日</p>	<p>■---【投薬】 イメトカプセル80mg(2日目以降)…1カプセ 1日1回 朝食後 2日</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆…1 1日</p>	
注射			<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml)…1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」 1mL (先発:カイトリル)…1管 15分間かけて 中心静脈注射…1 1回</p> <p>テルモ生食 250mL…1袋 プスルフェクス点滴静注用【規格 分解用】…1mg (精密持続)中心静脈注射… 1 (10)時から(13)時まで 1回</p> <p>大塚生食注(50ml)…1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 中心静脈注射…1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml)…1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カ イトリル)…1管 15分間かけて 中心静脈注射…1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml)…1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】…1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 中心静脈注射…1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml)…1袋 エンドキサン注【規格分解用】…1 mg 3時間かけて 中心静脈注射…1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml)…1袋 エンドキサン注【規格分解用】…1 mg 3時間かけて 中心静脈注射…1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml)…1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後 のフラッシュ用 中心静脈注射…1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml)…1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】…1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始4時間後 中心静脈注射…1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml)…1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】…1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始8時間後 中心静脈注射…1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml)…1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カ イトリル)…1管 15分間かけて 中心静脈注射…1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml)…1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】…1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 中心静脈注射…1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml)…1袋 エンドキサン注【規格分解用】…1 mg 3時間かけて 中心静脈注射…1 1回</p> <p>テルモ生食(500ml)…1袋 エンドキサン注【規格分解用】…1 mg 3時間かけて 中心静脈注射…1 1回</p> <p>大塚生食注(50ml)…1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後 のフラッシュ用 中心静脈注射…1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml)…1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】…1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始4時間後 中心静脈注射…1 1回</p> <p>大塚生食注(100ml)…1瓶 ウロミキサン注【規格分解用】…1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始8時間後 中心静脈注射…1 1回</p>				