

					休薬終了日
Day1		Day2	Day3	Day4	Day5
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>イメトカプセル125mg(1日目) … 1カプセル 1日1回 混注OK確認後に内服 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>イメトカプセル80mg(2日目以降) … 1カプセル 1日1回 朝食後 2日</p>			
注射	<p>■---【注射】</p> <p>アロキン点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 デカロン注射液2mg(1.65mg/0.5ml) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのパライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与4時間後 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与8時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>--- テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>--- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのパライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>--- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与4時間後 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>--- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与8時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>