

	Day1	Day2	Day3
投薬	<p>■---【投薬】 イメト[®]カ[®]セル125mg(1日目) … 1カ[®]セ 1日1回 混注OK確認後に内服 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 イメト[®]カ[®]セル80mg(2日目以降) … 1カ[®]セ 1日1回 朝食後 2日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】 … 1錠 レスタミンコ[®]錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別[®]パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>
注射	<p>■---【注射】 アロキシ点滴静注[®]0.75mg (50mL) … 1 袋 デ[®]カ[®]ロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg) … 1瓶 デ[®]カ[®]ロン注射液1.65mg(リン酸エステルとし て2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウ[®]ミ[®]テ[®]キサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルート[®]のプライミング用と点滴終 了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウ[®]ミ[®]テ[®]キサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて0 エンドキサン投与4時間後 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウ[®]ミ[®]テ[®]キサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与8時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デ[®]カ[®]ロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウ[®]ミ[®]テ[®]キサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与開始時 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エンドキサン注[CPA/CPM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルート[®]のプライミング用と点滴終 了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウ[®]ミ[®]テ[®]キサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与4時間後 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウ[®]ミ[®]テ[®]キサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて エンドキサン投与8時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デ[®]カ[®]ロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg) … 1瓶 15分間かけて 朝 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤 … 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】 … 1mg 朝 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>

	休業終了日
Day4	Day5
<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカトン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 朝 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカトン注射液8mg(mg用)中止 … 8mg 15分間かけて 朝 点滴 … 1 1回</p>