

エトキシド大量療法

		休業終了日	
		Day1	Day2
		Day3	
投薬			
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>
	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて ★開始時刻を薬局へ連絡★ 点滴 … 1 1回</p>
	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p>
	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>