

エトポシド大量療法+R

				休業終了日
	Day1	Day2	Day3	Day4
投薬				<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠                      レスタミンコーワ錠10mg… 5錠                      1日1回                      リツキシマブ投与30分前に内服                      ☆☆別パック☆☆                      1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1                      1日</p>
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先                      発:カイトリル)… 1管                      15分間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg                      2時間かけて                      ★開始時刻を薬局へ連絡★                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg                      2時間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      点滴終了後のフラッシュ用                      点滴… 1                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先                      発:カイトリル)… 1管                      15分間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg                      2時間かけて                      ★開始時刻を薬局へ連絡★                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg                      2時間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      点滴終了後のフラッシュ用                      点滴… 1                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      グラニセトロン静注液1mg「テバ」1mL (先                      発:カイトリル)… 1管                      15分間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg                      2時間かけて                      ★開始時刻を薬局へ連絡★                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋                      ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg                      2時間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      点滴終了後のフラッシュ用                      点滴… 1                      1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶                      ソル・コーテフ注射用(100mg)… 1瓶                      30分間かけて                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】…                      0.9mL                      リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg                      朝                      点滴… 1                      1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶                      点滴終了後のフラッシュ用                      点滴… 1                      1回</p>