

					休業終了日
	Day1	Day8	Day15	Day22	Day28
投薬	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 エムプリシティ投与30~90分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 エムプリシティ投与30~90分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 エムプリシティ投与30~90分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 エムプリシティ投与30~90分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 5瓶 15分間かけて エムプリシティ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(エムプリシティ)【規 … 1mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml エムプリシティ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 5瓶 15分間かけて エムプリシティ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(エムプリシティ)【規 … 1mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml エムプリシティ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 5瓶 15分間かけて エムプリシティ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(エムプリシティ)【規 … 1mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml エムプリシティ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 5瓶 15分間かけて エムプリシティ投与1時間前 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 生理食塩液(エムプリシティ)【規 … 1mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 40ml エムプリシティ点滴静注【規格分解用】 … 1mg 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 1回</p>	