

	Day1	Day2	Day8	Day9
投薬	<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 ダラキューロ投与1～3時間前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>		<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 ダラキューロ投与1～3時間前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】 点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 光糖液5%(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】… 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>皮下注… 1 ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1mg 3～5分かけて 翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注でプライミングする 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 光糖液5%(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】… 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 光糖液5%(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】… 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>皮下注… 1 ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】… 1mg 3～5分かけて 翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注でプライミングする 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 3瓶 15分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 光糖液5%(100ml)… 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用)… 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】… 1mg 30分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶解 1回</p> <hr/> <p>点滴… 1 大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p>

			休薬終了日
Day15	Day16	Day22	Day28
<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 ダラキューロ投与1～3時間前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		<p>■---【投薬】 カロナール錠【500mg】… 2錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 ダラキューロ投与1～3時間前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 3瓶 15 分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30 分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶 解 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>皮下注 … 1 ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】 … 1mg 3～5分かけて 翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注 でプライミングする 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 3瓶 15 分間かけて 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 フラッシュ用 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 光糖液5%(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 45ml カイプロリス点滴静注用【規格分解用】 … 1mg 30 分間かけて カイプロリス10mgに対して蒸留水5mLで溶 解 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 5瓶 15 分間かけて 1回</p> <hr/> <p>皮下注 … 1 ダラキューロ配合皮下注【規格分解用】 … 1mg 3～5分かけて 翼状針ルートの3/4までダラキューロ皮下注 でプライミングする 1回</p>	