

	Day1	休薬終了日 Day14
投薬	■---【投薬】 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日	
	----- 【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日	
	----- ミサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 … 2C 1日2回 朝・夕 食後 14日	
	----- ヒルトイドローション0.3%(50g) … 2本 1日頻回 保湿 1日	
	----- ☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日	

	Day1	休薬終了日 Day14
注射	■---【注射】 大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 静脈内注射 … 1 1回	
	----- アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回	
	----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて ベクティビックス投与前 本管② 点滴 … 1 1回	
	----- 大塚生食注(100ml) … 1瓶 ベクティビックス点滴静注【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて インラインフィルター使用 本管③ 点滴 … 1 1回	
	----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管④ ベクティビックス投与終了後 点滴 … 1 1回	
	----- テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 側管 カンプトと同時に 点滴 … 1 1回	
	----- テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 カンプト注[CPT-11]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて 本管⑤ レボホリナートと同時に 点滴 … 1 1回	
	----- 大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で 本管⑥ 点滴 … 1 1回	
	----- 点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑦ 1回	
	----- 生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL フルオウラシル注(バクスター-230mL用)【規格分解 … 1mg 46時間かけて バクスターインフュージョンポンプLV5に充填 本管⑧ 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回	
	----- 生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒 インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。 管注 … 1 1回	