

	Day1	休薬終了日 Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカトロン錠 … 2錠</p> <p>1日1回 朝食後</p> <p>翌日から内服</p> <p>2日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1</p> <p>1日</p>	

	Day1	休薬終了日 Day14
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(20ml) … 1管</p> <p>逆血確認用</p> <p>静脈内注射 … 1</p> <p>1回</p> <hr/> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋</p> <p>デカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶</p> <p>デカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管</p> <p>15分間かけて</p> <p>本管①</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶</p> <p>アバステン注【規格分解用】 … 1mg</p> <p>初回投与は90分、問題がなければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能</p> <p>本管②</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>5分間かけて</p> <p>本管③</p> <p>アバステン投与後のフラッシュ用</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋</p> <p>レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg</p> <p>120分間かけて</p> <p>側管</p> <p>カンプトと同時に</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋</p> <p>カンプト注[CPT-11]【規格分解用】 … 1mg</p> <p>90分間かけて</p> <p>本管④</p> <p>レボホリナートと同時に</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>フルオロウラル注【規格分解用】 … 1mg</p> <p>全開で</p> <p>本管⑤</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>本管⑥</p> <p>1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL</p> <p>フルオロウラル注(バクスター230mL用)【規格分解 … 1mg</p> <p>46時間かけて</p> <p>バクスターインフュージョンポンプLV5に充填</p> <p>本管⑦</p> <p>抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1</p> <p>1回</p> <hr/> <p>生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒</p> <p>インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。</p> <p>管注 … 1</p> <p>1回</p>	