

	Day1	休薬終了日
	Day1	Day14
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミンコ-7錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <hr/> <p>【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	

	Day1	休薬終了日
	Day1	Day14
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(20ml) … 1管 逆血確認用 静脈内注射 … 1 1回</p> <hr/> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食 250mL … 1袋 サイラムサ点滴静注液【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 蛋白質透過型のフィルター(0.2又は0.22ミクロン)を使用し、他の薬剤と同じラインを使用しないこと。 本管② 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて サイラムサ投与後のフラッシュ用 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 側管 カンプトと同時に 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 カンプト注[CPT-11]【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて 本管④ レボホリナートと同時に 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>点滴 … 1 大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑥ 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(5FU)【規格薬 … 229.98mL フルオウラシル注(バクスター-230mL用)【規格分解 … 1mg 46時間かけて バクスターインフュージョンポンプLV5に充填 本管⑦ 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回</p> <hr/> <p>生食注シリンジ「オーツカ」10mL (ルアーロック) … 1筒 インフュージョンポンプ終了時。側管から注入後、自己抜針。 管注 … 1 1回</p>	