

S-1 オキサリプラチン+ベバシズマブ (Sox+Bev)療法

	Day1	Day21	休薬終了日
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>レスタミン<sup>®</sup>7錠10mg … 5錠 1日1回 点滴開始30分前に内服 1日</p> <p>-----</p> <p>ティーエスワン配合錠【規格分解用】 … 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay15朝まで内服 14日</p> <p>-----</p> <p>【4mg】デカ<sup>®</sup>ロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 翌日から内服 2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		

	Day1	Day21	休薬終了日
注射	<p>■---【注射】</p> <p>アロキン点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカ<sup>®</sup>ロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして 8mg) … 1瓶 デカ<sup>®</sup>ロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして 2mg) … 2管 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 アバステン注【規格分解用】 … 1mg 初回投与は90分、問題なければ2回目は60 分、3回目以降は30分に短縮可能 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 5分間かけて 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 オキサリプラチン注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 本管④ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管⑤ 点滴 … 1 1回</p>		