

CapeIRI+ペバシズマブ療法

		休薬終了日
	Day1	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カベシズマブ錠【規格分解用】… 1mg 1日2回 朝・夕 食後 Day1夕からDay15朝まで内服 14日</p> <hr/> <p>【4mg】テカロン錠… 2錠 翌日から内服 1日1回 朝食後 2日</p> <hr/> <p>ヒルドイトソフト軟膏0.3%(25g)… 3本 保湿 1日頻回 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL)… 1袋 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg)… 1瓶 テカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg)… 2管 15分間かけて 本管① 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 アバステン注【規格分解用】… 1mg 初回投与は90分、問題なければ2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能 本管② 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 5分間かけて アバステン投与後のフラッシュ用 本管③ 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ糖注5%(250mL)… 1袋 カプト注[CPT-11]【規格分解用】… 1mg 90分間かけて 本管④ 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 本管⑤ 点滴… 1 1回</p>	