

	Day1	Day8	Day15	Day22
投薬				
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p>
	<p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 点滴 … 1 1回</p>	<p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 点滴 … 1 1回</p>
	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で レボホリナート開始1時間後 側管 … 1 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で レボホリナート開始1時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で レボホリナート開始1時間後 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で レボホリナート開始1時間後 点滴 … 1 1回</p>
	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>

			休薬終了日
	Day29	Day36	Day56
投薬			
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオロウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で レボホリナート開始1時間後 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 テカロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 レボホリナート注【規格分解用】 … 1mg 120分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 フルオロウラシル注【規格分解用】 … 1mg 全開で レボホリナート開始1時間後 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	