

ゲムシタピン単独療法(胆のう癌)

|    |   |   |   | 休業終了日 |
|----|---|---|---|-------|
|    | Day1  | Day8  | Day15   | Day28 |
| 投薬 |   |   |   |       |
| 注射 | <p>■---【注射】<br/>                     大塚生食注(50ml) … 1瓶<br/>                     デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶<br/>                     15分間かけて<br/>                     本管①<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p> | <p>■---【注射】<br/>                     大塚生食注(50ml) … 1瓶<br/>                     デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶<br/>                     15分間かけて<br/>                     本管①<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p> | <p>■---【注射】<br/>                     大塚生食注(50ml) … 1瓶<br/>                     デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶<br/>                     15分間かけて<br/>                     本管①<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p> |       |
|    | <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶<br/>                     ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg<br/>                     30分間かけて<br/>                     本管②<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p>   | <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶<br/>                     ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg<br/>                     30分間かけて<br/>                     本管②<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p>   | <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶<br/>                     ゲムシタピン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg<br/>                     30分間かけて<br/>                     本管②<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p>   |       |
|    | <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶<br/>                     本管③<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p>  | <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶<br/>                     本管③<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p>  | <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶<br/>                     本管③<br/>                     点滴 … 1<br/>                     1回</p>  |       |