

パクリタキセル+アテゾリズマブ療法

	Day1	Day8	Day15	休薬終了日 Day28
投薬				
注射	<p>■---【注射】</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋</p> <p>テセントリク点滴静注【規格分解用】… 840mg</p> <p>60 分間かけて</p> <p>2クール目からは30分投与も可</p> <p>O. 2又はO. 22ミクロンのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>5分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>アロキシ点滴静注パック0.75mg (50mL) … 1袋</p> <p>15 分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶</p> <p>アブラキサン点滴静注用【規格分解用】… 1mg</p> <p>g</p> <p>30 分間かけて</p> <p>100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注パック0.75mg (50mL) … 1袋</p> <p>15 分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶</p> <p>アブラキサン点滴静注用【規格分解用】… 1mg</p> <p>g</p> <p>30 分間かけて</p> <p>100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>テルモ生食 250mL … 1袋</p> <p>テセントリク点滴静注【規格分解用】… 840mg</p> <p>g</p> <p>30 分間かけて</p> <p>O. 2又はO. 22ミクロンのメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>5分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>アロキシ点滴静注パック0.75mg (50mL) … 1袋</p> <p>15 分間かけて</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶</p> <p>アブラキサン点滴静注用【規格分解用】… 1mg</p> <p>g</p> <p>30 分間かけて</p> <p>100mgあたり、20mLの生理食塩水で懸濁。投与時はインラインフィルターを使用しないこと。</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶</p> <p>点滴 … 1</p> <p>1回</p>	