

ゲムシタビン カルボプラチン(GCAP)療法

				休薬終了日
	Day1	Day2	Day8	Day21
投薬		<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 2日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ0.75mg (50mL) … 1袋 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルとして2mg) … 2管 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ糖注5%(250mL) … 1袋 カルボプラチン注[CBDCA]【規格分解用】 … 1mg 60分間かけて 本管③ 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>		<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>光糖液5%(100ml) … 1瓶 ゲムシタビン注[GEM]【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴 … 1 1回</p>	