

エンホルツマブ ベドチン療法

	Day1	Day8	Day15	休薬終了日 Day28
投薬	<p>■---【投薬】 ヒルトイトロシオン0.3%(50g) … 4本 医師の指示通り 1日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>			
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml パドセブ注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② パドセブ30mgに対し蒸留水3.3mlで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 5分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml パドセブ注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② パドセブ30mgに対し蒸留水3.3mlで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 5分間かけて 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとして8mg) … 1瓶 15分間かけて 本管① 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml パドセブ注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて 本管② パドセブ30mgに対し蒸留水3.3mlで溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 本管③ 点滴 … 1 5分間かけて 1回</p>	