

	Day1	Day2	Day3	Day4
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>		<p>■---【投薬】</p> <p>フルメロン点眼液0.1% (5ml)… 1本 1日4回 両眼に 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ソル・マトール注射用(100mg)… 1瓶 30分間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】… 1mL リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg 朝 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発: カイトリル)… 1管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 ソル・マトール静注用40mg(mg用)… 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 マトレキセト注(MTX)(液体)【規格分… 1mg g 3時間かけて 10時 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 マトレキセト注(MTX)(液体)【規格分… 1mg g 23時間かけて 11時 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 ソル・マトール静注用40mg(mg用)… 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発: カイトリル)… 1管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 ソル・マトール静注用40mg(mg用)… 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 シタリン点滴静注液【規格分解用】… 1mg g 3時間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 22時 静脈内注射… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 ソル・マトール静注用40mg(mg用)… 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 シタリン点滴静注液【規格分解用】… 1mg g 3時間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 16時 静脈内注射… 1 1回</p> <hr/> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 22時 静脈内注射… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 ソル・マトール静注用40mg(mg用)… 50mg ? 分間かけて… 15 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 シタリン点滴静注液【規格分解用】… 1mg g 3時間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 4時 静脈内注射… 1 1回</p> <hr/> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 10時 静脈内注射… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発: カイトリル)… 1管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 ソル・マトール静注用40mg(mg用)… 50mg 15分間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 シタリン点滴静注液【規格分解用】… 1mg g 3時間かけて 12時間ごと 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>

	休業終了日
Day5	Day21
<p>■――【注射】</p> <p>ロイコリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 4時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロイコリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 10時 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロイコリン注3mg 0.3%1mL【B採用】… 5管 16時 静脈内注射 … 1 1回</p>	