

R-DA-EPOCH療法(レベル1)						休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠            レスタミンコーワ錠10mg … 5錠            1日1回            リツキシマブ投与30分前内服            ☆☆別パック☆☆            1日</p> <hr/> <p>プレドニゾン錠【規格分解用】… 1mg            1日1回 朝食後            ☆☆別パック☆☆            5日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1            1日</p>					
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤 …            0.9mL            リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg            点滴 … 1            1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1            テルモ生食(500ml) … 1袋            アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】…            1mg            オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg            ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg            24時間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1            テルモ生食(500ml) … 1袋            アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】…            1mg            オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg            ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg            24時間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1            テルモ生食(500ml) … 1袋            アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】…            1mg            オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg            ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg            24時間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15分間かけて            点滴 … 1            1回</p> <hr/> <p>持続点滴 … 1            テルモ生食(500ml) … 1袋            アドリアシン注[ADM/DXR]【規格分解用】…            1mg            オンコピン注[VCR]【規格分解用】… 1mg            ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg            24時間かけて            1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:            カイトリル) … 1管            15分間かけて            側管 … 1            1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋            エドキシサン注[CPA/CPM]【規格分解用】…            1mg            2時間かけて            側管 … 1            1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶            閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了            後のフラッシュ用            点滴 … 1            1回</p>	