

R-CEPP療法

			休業終了日
	Day1	Day8	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>ラステットSカプセル【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 3日</p> <p>-----</p> <p>塩酸プロカルバジンカプセル【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 10日</p> <p>-----</p> <p>プレドニゾン錠【規格分解用】… 1mg 1日1回 朝食後 ☆☆別パック☆☆ 10日</p> <p>-----</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラネセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エドキシサン注[CPA/GPM]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤】… 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】… 1mg 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラネセロン静注液1mg「テハ」1mL (先発:カイトリル) … 1管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 エドキシサン注[CPA/GPM]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	