

				休薬終了日
	Day1	Day2	Day3	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタシノー7錠10mg… 5錠 1日1回 リツキンマブ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <hr/> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆… 1 1日</p>			
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL（先発: カイトリル）… 1管 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 5瓶 30分間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 休マイト注[IFM]【規格分解用】… 1mg 3時間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始時 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食 250mL… 1袋 カルホブラチン注[CBDCA]【規格分解用】… 1mg 30分間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>生理食塩液(リツキンマブ)【規格薬剤】… 0.9mL リツキンマブ注【規格分解用】… 1mg 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了 後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始4時間後 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始8時間後 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL（先発: カイトリル）… 1管 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 5瓶 30分間かけて0 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 休マイト注[IFM]【規格分解用】… 1mg 3時間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始時 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了 後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始4時間後 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始8時間後 点滴… 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL（先発: カイトリル）… 1管 テカロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 5瓶 30分間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】… 1mg 2時間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml)… 1袋 休マイト注[IFM]【規格分解用】… 1mg 3時間かけて 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始時 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了 後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始4時間後 点滴… 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】… 1mg 30分間かけて イホマイド投与開始8時間後 点滴… 1 1回</p>	