

	Day1	Day2	Day3
投薬	<p>■---【投薬】 イメトカブセル125mg(1日目) … 1カブセ 1日1回 混注OK確認後に内服 1日</p>	<p>■---【投薬】 イメトカブセル80mg(2日目以降) … 1カブセ 1日1回 朝食後 2日</p>	
注射	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管) 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 メトキシセト注[MTX](液体)【規格分 … 1mg 6時間かけて 10時 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管) デカドロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 イホマイト注[IFM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始時 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始4時間後 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 16時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始8時間後 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 22時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テバ」1mL (… 1管) デカドロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 イホマイト注[IFM]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始時 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注[VP-16]【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始4時間後 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロテキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始8時間後 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 10時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 16時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>ロコホリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 22時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p>

Day4	Day8	Day10	Day12
<p>■---【注射】 大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトロン静注液1mg「テハ」1mL (… 1管 テカトロン注射液8mg(6.6mg/2ml) … 5瓶 30分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 イホマイト注【IFM】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始時 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>テルモ生食(500ml) … 1袋 ラステット注【VP-16】【規格分解用】 … 1mg 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始4時間後 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 ウロキサン注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて イホマイト投与開始8時間後 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ロコボリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 4時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ロコボリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 10時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ロコボリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 16時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>ロコボリン注3mg 0.3%1mL【B採用】 … 5管 22時 静脈内注射 … 1 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 テルモ生食(500ml) … 1袋 ロイナセ注【L-ASP】【規格分解用】 … 1U 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 テルモ生食(500ml) … 1袋 ロイナセ注【L-ASP】【規格分解用】 … 1U 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 テルモ生食(500ml) … 1袋 ロイナセ注【L-ASP】【規格分解用】 … 1U 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>

Day14	Day16	Day18	Day20
<p>■---【注射】 テルモ生食(500ml) … 1袋 ロイナセ注[L-ASP]【規格分解用】 … 1U 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 テルモ生食(500ml) … 1袋 ロイナセ注[L-ASP]【規格分解用】 … 1U 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 テルモ生食(500ml) … 1袋 ロイナセ注[L-ASP]【規格分解用】 … 1U 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 テルモ生食(500ml) … 1袋 ロイナセ注[L-ASP]【規格分解用】 … 1U 2時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <hr/> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 点滴終了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>

休薬終了日
Day28