

BG併用療法<2クール目以降>(入院)

				休業終了日	
		Day1	Day2	Day3	Day28
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg… 5錠 1日1回 ガザイバ投与30~60分前に内服 1日</p>			<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】テカトロン錠… 2錠 1日1回 朝食後 2日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先 発:カイトリル)… 1管 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 1瓶 テカトロン注射液1.65mg(リン酸エステルとし て2mg)… 2管 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】… 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml トリアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1 mg 1時間かけて トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで 溶解 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 トリアキシンの側管から 1時間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終 了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>テルモ生食 250mL (mL用)… 210ml ガザイバ点滴静注1000mg【規格分解… 1000mg 朝 点滴… 1 0.2μmのインラインフィルターを通して 投与 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 グラニセロン静注液1mg「テハ」1mL (先 発:カイトリル)… 1管 テカトロン注射液6.6mg(リン酸エステルとし て8mg)… 1瓶 15分間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】… 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用)… 60ml トリアキシン点滴静注用【規格分解用】… 1 mg 1時間かけて トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで 溶解 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(100ml)… 1瓶 トリアキシンの側管から 1時間かけて 点滴… 1 1回</p> <p>-----</p> <p>大塚生食注(50ml)… 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終 了後のフラッシュ用 点滴… 1 1回</p>			