

Pola+BR療法<1クール目>

	Day1	Day2	Day3	休薬終了日
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 ポライビー投与30分前に内服 ☆☆別パック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカロン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 2日</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラネセロン静注液1mg「テハ」1mL (先 発:カイトリル) … 1管 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルと して8mg) … 1瓶 デカロン注射液1.65mg(リン酸エステルと して2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>生理食塩液(トレアキシン)【規格薬剤】 … 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 60ml トレアキシン点滴静注用【規格分解用】 … 1 mg 1時間かけて トレアキシン25mgに対し蒸留水10mLで 溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 トレアキシンの側管から 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終 了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤 … 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】 … 1mg 朝 点滴 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラネセロン静注液1mg「テハ」1mL (先 発:カイトリル) … 1管 デカロン注射液6.6mg(リン酸エステルと して8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>生理食塩液(トレアキシン)【規格薬剤】 … 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 60ml トレアキシン点滴静注用【規格分解用】 … 1 mg 1時間かけて トレアキシン25mgに対し蒸留水10mLで 溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 トレアキシンの側管から 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終 了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ポライビー注【規格分解用】 … 1mg 90分間かけて ポライビー30mgに対し蒸留水1.8mLで溶 解 0.2μmのインラインフィルターを通して 投与 1回</p>		