

				休薬終了日
Day1		Day2	Day3	Day21
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>カロナール錠【500mg】… 1錠 レスタミンコーワ錠10mg … 5錠 1日1回 リツキシマブ投与30分前に内服 ☆☆別バック☆☆ 1日</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>		<p>■---【投薬】</p> <p>【4mg】デカトン錠 … 2錠 1日1回 朝食後 2日</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>☆☆薬剤情報提供☆☆ … 1 1日</p>	
	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトン静注液1mg「テバ」1mL (先 発:カイトリル) … 1管 デカトン注射液6.6mg(リン酸エステルと して8mg) … 1瓶 デカトン注射液1.65mg(リン酸エステルと して2mg) … 2管 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】 … 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 60ml トリアキシン点滴静注用【規格分解用】 … 1 mg 1時間かけて トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで 溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 トリアキシンの側管から 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終 了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>生理食塩液(リツキシマブ)【規格薬剤 … 0.9mL リツキシマブ注【規格分解用】 … 1mg 朝 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>点滴 … 1 大塚生食注(100ml) … 1瓶 大塚蒸留水20ml(ml用) … 20ml ポライビー注【規格分解用】 … 1mg 30分間かけて ポライビー30mgに対し蒸留水1.8mLで 溶解 0.2μmのインラインフィルターを通して 投与 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 グラニセトン静注液1mg「テバ」1mL (先 発:カイトリル) … 1管 デカトン注射液6.6mg(リン酸エステルと して8mg) … 1瓶 15分間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>生理食塩液(トリアキシン)【規格薬剤】 … 249.6mL 大塚蒸留水20ml(ml用) … 60ml トリアキシン点滴静注用【規格分解用】 … 1 mg 1時間かけて トリアキシン25mgに対し蒸留水10mLで 溶解 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>大塚生食注(100ml) … 1瓶 トリアキシンの側管から 1時間かけて 点滴 … 1 1回</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>大塚生食注(50ml) … 1瓶 閉鎖式ルートのプライミング用と点滴終 了後のフラッシュ用 点滴 … 1 1回</p>		
注射				